

ენტეროჰემორაგიული ნაწლავური ინფექცია
(ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები)

ინკუბაციური პერიოდი: 2-9 დღე

სიმპტომები: დიარეა (წყლიანი, სისხლიანი), მუცლის მწვავე ტკივილი, გულისრევა, მსუბუქი ციებ-ცხელება.

გამოყენებული სურსათი: ნედლი ან თერმულად არასაკმარისად დამუშავებული ძროხის ხორცის ფარში, ყველი, არაპასტერიზებული რძე, მაიონეზი.

ბოტულიზმი
(Clostridium botulinum)

ინკუბაციური პერიოდი: 18-36 საათი

სიმპტომები: დაღლილობა, სისუსტე, თავბრუსხვევა, მხედველობის გაორება, გაძნელებული მეტყველება და ყლაპვა, ყაბზობა.

გამოყენებული სურსათი: დაკონსერვებული პროდუქტები, მოშუშული ხორცი, ძეხვის, ფრინველის ხორცის პროდუქტები.



სალმონელოზი
(Salmonella)

ინკუბაციური პერიოდი: 6-72 საათი

სიმპტომები: მუცლის ტკივილი, ციებ-ცხელება, ტემპერატურა, ფაღარათი, ღებინება.

გამოყენებული სურსათი: ფრინველის ხორცი და მისი სალათები, ხორცი, ხორცის პროდუქტები, თევზი, კრევეტები, დაჭრილი ხილ-ბოსტნეული, რძე, კვერცხი.



სტაფილოკოკური ინფექცია
(Staphylococcus aureus)

ინკუბაციური პერიოდი: 0,5-6 საათი

სიმპტომები: გულისრევა, ღებინება, ქვალები მუცელში, თავისა და კუნთების ტკივილი, კრუნჩხვა, წნევის და პულსის ცვლილება.

გამოყენებული სურსათი: ლორი და სხვა ხორცეული, კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი, კრემიანი საკონდიტრო ნაწარმი.



ლისტერიოზი
(Listeria monocytogenes)

ინკუბაციური პერიოდი: 2-30 დღე

სიმპტომები: მუცლის ტკივილი, ციებ-ცხელება, ტემპერატურა, ფაღარათი, ღებინება.

გამოყენებული სურსათი: არაპასტერიზებული რძე, ყველი, ნაყინი, ნედლი ბოსტნეული, ფრინველის და ძროხის ხორცი, ზღვის პროდუქტები, მზა სურსათი.